

水がなくても服用できる胃腸薬

太田胃散 チュアブル

NEO
ネオ

第3類医薬品



かんでスツクリ
レモンライム味

胸やけ
胃の膨満感
胃の不快感

〈実物大〉

 太田胃散

18錠

急な胃のトラブルに効く /

▲ここからお切りください。開封後はチャックを閉じて保管してください。

太田胃散チュアブルNEO 18錠

第3類医薬品

△使用上の注意

チャック▲

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人。
2. 服用後、便秘、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 胸やけ、胃部膨満感、胃部不快感、胃痛、胃酸過多、胃もたれ、胃重、飲みすぎ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、胸つかえ、げっぷ、嘔吐
用法・用量 次の量を1日3回、かみくだくか、口の中でとかして服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

●成人(15歳以上)…1回2錠 ●15歳未満…服用しないこと

成分 1日量(6錠)中

●水酸化マグネシウム……………600mg	} 制酸剤	〈添加物〉L-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、銅クロロフィリンNa、ステアリン酸Mg、セルロース、粉末還元麦芽糖水アメ、キシリトール
●炭酸マグネシウム……………600mg		
●沈降炭酸カルシウム……………960mg		
●ジメチルポリシロキサン………120mg		

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)錠剤の斑点は成分によるもので、品質には問題ありません。(5)水分の付着が変色等の原因となりますので、ぬれた手で錠剤に触れないでください。また、ぬれた手等で触れた錠剤は袋に戻さないでください。(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元

株式会社 太田胃散

東京都文京区千石2-3-2

<http://www.ohta-isan.co.jp/>

製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散

「お客様相談室」

☎(03)3944-1311(代表)

受付時間 9:30~17:00

(土、日、祝日等を除く)

副作用救済制度 0120-149-931

製造
番号
使用
期限



PE,M,PET

