



緩解胃部不適或灼熱感·幫助消化

太田胃腸錠

Ohta's Isan A Tablet

太田胃腸錠劑，能促進消化，調節胃中酸度，因而減輕(緩和)胃的負擔，是改善胃腸不舒服症狀之胃腸藥。

◎ 對於因脂肪、肉類引起的“胃脹難受”有效。

Biodiastase1000、LipaseAP6、Ursodeoxycholic Acid、Prozyme6消化脂肪、肉類、澱粉消化酵素，對於油膩及暴飲暴食所引起的胃脹難受，有很好的效果。

◎ 凡消化不良、胃脹難受時，請於飯後或兩餐間服用，也建議睡前服用。

◎ 錠劑吞食容易，快速溶解，能使胃達到舒暢，咀嚼後服用亦可。

【成份】每錠含量

	成份	每粒中	作用
制酸劑	Sodium Bicarbonate	170 mg	不同作用的制酸劑，具有調整胃中酸度，保護胃壁的效果。
	Synthetic Hydrotalcite	100 mg	
	Precipitated Calcium Carbonate	30 mg	
消化劑	Biodiastase1000	6.67 mg	幫助澱粉、蛋白質及脂肪的消化。 促進膽汁分泌。
	Prozyme6	3.33 mg	
	LipaseAP6	6.67 mg	
	Ursodeoxycholic Acid	1.4 mg	
健胃生藥成份	Cinnamon Oil	1.16 mg	具有生藥成分和健胃作用，促進胃液的分泌及胃的蠕動。
	Fennel Oil	0.18 mg	

本產品單次劑量(3錠)之酸中和能力為 16.71 mEq，鎂含量為 5.94 mEq，鈉含量為 6 mEq

【賦形劑】 Lemon Oil、乳糖、Carmellose Calcium、Microcrystalline Cellulose、*l*-menthol、碳酸鎂、天然 Vitamin E、Acacia、硬脂酸鎂、黃色 4 號。

【適應症】 緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，幫助消化。

【用法、用量】

年齡	1次量	1日服用次數
成人(12歲以上)	3錠	3-4次
6-12歲	1.5錠	
3-6歲	0.5錠	
3歲未滿	請洽醫師診治，不宜自行使用	

【包裝】

18錠~1000錠玻璃瓶裝，鋁箔盒裝

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。(25°C以下)
- 三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 五、使用前請詳閱說明書。

【警語】

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - 1、對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5g。
 - 2、未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
 - 3、本藥品每日最大建議劑量之含鈉量超過 5mEq (0.115g)，須限鹽飲食之患者不要服用。
 - 4、(1) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
(2) 制酸劑不得併用其他藥品。
- 二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 三、消化到潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 四、本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
- 五、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。
- 六、本藥含鈣之制酸成分，可能引起便秘或腹瀉；長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- 七、本藥含碳酸鹽（或碳酸氫鹽）之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。
- 八、本藥含碳酸氫鈉會引起腹脹、打嗝；如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象；腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫之患者禁止使用。
- 九、本藥含消化酵素成分有些病人可能對酵素過敏，偶有過敏現象。
- 十、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症（Dialysis Osteomalacia）、透析性腦病變（Dialysis encephalopathy）及低磷血症，應謹慎小心使用。
- 十一、臨床試驗：依據一項 5 年隨機雙盲之臨床研究顯示，ursodeoxycholic acid 以建議治療劑量（13-15 mg/kg/d）的 2 倍（28-30mg/kg/d）治療原發性硬化膽道炎（primary sclerosing cholangitis）之病人（共納入 150 位），結果顯示，用藥組發生臨床事件（死亡、肝臟移植或 minimal listing criteria）的風險為對照組的 2.1 倍（ $p < 0.05$ ），也有較高發生嚴重不良事件的風險（包含靜脈曲張、肝硬化及膽道癌，63% vs. 37%， $p < 0.01$ ），此臨床試驗顯示，使用本品肝功能指數雖降低，但反而增加臨床事件風險。

製造廠： 株式会社 太田胃散
OHTA'S ISAN CO., LTD.

(公司地址) 3-2, Sengoku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan
(廠址) 957 Shishiko-cho, Ushiku-shi, Ibaraki-ken, Japan

<http://www.ohta-isan.co.jp/>

藥商：幼祥實業股份有限公司
台北市新東街 15 巷 13 號

02202-M1