

太田胃散<内服液>S 指定医薬部外品

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、服用を中止し、製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。しばらく服用しても症状がよくなる場合。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 開栓されている製品は服用しないでください。開栓後は保存しないでください。

ガラス:瓶 金属:キャップ

使用
期限

製造
番号



太田胃散 <内服液>S

ムカムカに
スツキリ
味

飲みすぎ
二日酔いのむかつき
食べすぎ

食前・食後・就寝前に

効能・効果

飲みすぎ又は食べすぎによる胃部不快感及びはきけ(二日酔・悪酔いのむかつき、胃のむかつき、悪心)

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回、1本を食前、食後又は就寝前に服用してください。15歳未満は服用しないでください。※生薬成分を含むため、沈澱を生じることがありますが、品質に影響はありません。よく振ってから服用してください。

成分 1日量(50mL) 中

ホップ流エキス0.17mL(ホップとして170mg)、
ケイヒ流エキス0.25mL(ケイヒとして250mg)、
ウイキョウ流エキス0.15mL(ウイキョウとして150mg)、
チョウジエキス606mg(チョウジとして200mg)、
チンピエキス50mg(チンピとして250mg)、
ショウキョウ流エキス0.25mL(ショウキョウとして250mg)、
カンゾウ抽出物10.5mg(カンゾウとして150mg)、
カルニチン塩化物160mg

[添加物] L-メントール、安息香酸Na、バラベン、
エタノール、ポリオキシエチレンポリオキシブ
ロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化
ヒマシ油、pH調整剤、香料、白糖

製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談係」

☎(03) 3944-1311 (代表)

受付時間 9:30~17:00(土、日、祝日を除く)

【発売元】



株式会社 太田胃散

東京都文京区千石2-3-2

<http://www.ohta-isan.co.jp/>

【製造販売元】

日新薬品工業株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町田郷80-1



太田胃散 50mL 指定医薬部外品