

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃のもたれ・食べすぎ・胃の痛みに

## 太田胃散A〈錠剤〉

第2類医薬品

### ● 特徴

胃腸薬

近年の食生活は多様化しています。加工食品や肉食など脂肪分の多い食事の増加や、不規則な食生活などによって、胃に負担をかける機会が増えています。

太田胃散A〈錠剤〉は、胃の中の脂肪分を分解することによって胃に対する負担をやわらげ、不快な症状を改善する胃腸薬です。

### ● 脂肪や肉類による“胃のもたれ”に効く

脂肪や肉類を消化するリパーゼAP6、ウルソデオキシコール酸、プロザイム6と、ビオチンエステラーゼ1000の働きで、脂っこい食事や食べすぎなどによっておこる胃のもたれに、すぐれた効果をあらわします。

### ● 症状に合わせた服用が効果的

胃がもたれたり胸やけがする時、胃の痛みがある時は、食後又は食間に服用してください。就寝前の服用もおすすめます。また、食欲がない時は食前に服用すると、食事がおいしくいただけます。

### ● のみやすい錠剤

錠剤をのみやすいように工夫しました。溶けやすく、さわやかな服用感で胃がスッキリします。かんで服用してもさしつかえありません。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。  
(4) 次の診断を受けた人。  
腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## ● 効能・効果

胃もたれ、食べすぎ、胃痛、胸やけ、食欲不振、消化不良、消化促進、飲みすぎ、胃酸過多、胸つかえ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、胃弱、胃重、嘔吐、げっぷ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)

## ● 用法・用量

次の量を食後又は食間(就寝前を含む)に水又はぬるま湯で服用してください。ただし、食欲不振の場合は食前に服用してください。かんで服用してもさしつかえありません。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
8～14歳	2錠	
5～7歳	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

※ 食間とは食後2～3時間のことをいいます。

### <用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ● 成分 1日量(9錠)中

成分	分量	主な作用	
消化剤	リパーゼ AP6	60 mg	脂肪を消化する酵素です。 たん白質を消化する酵素です。 でんぶんやたん白質を消化する酵素です。 胆汁の分泌を促し、脂肪の消化を助けます。
	プロザイム 6	30 mg	
	ピオヂアスターゼ 1000	60 mg	
	ウルソデオキシコール酸	12.6 mg	
制酸剤	炭酸水素ナトリウム	1,530 mg	作用の異なる各制酸剤が、胃の中の酸度を効果的に調整します。
	合成ヒドロタルサイト	900 mg	
	沈降炭酸カルシウム	270 mg	
健胃生薬成分	ケイヒ油	10.40mg	生薬成分が持つ特有の芳香と健胃作用で、胃の働きを良好にします。
	レモン油	4.46mg	
	ウイキョウ油	1.65mg	

[添加物] l-メントール、乳糖、黄色4号(タートラジン)、アラビアゴム、ステアリン酸Mg、炭酸Mg、カルメロースCa、セルロース、天然ビタミンE

## ● 保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ● 包装 45錠(分包タイプ)、120錠・300錠(ビン入り)

その他、下記の姉妹品があります。目的に合わせてご利用ください。

飲みすぎ・胸やけ・胃の不快感に **太田胃散** (缶入り・分包タイプがあります)

ストレスによる神経性胃炎・慢性胃炎に **太田漢方胃腸薬II** (散剤・錠剤タイプがあります)

### 製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談室」  
☎(03) 3944-1311 (代表)  
受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日等を除く)

製造販売元

株式会社 太田胃散  
東京都文京区千石2-3-2  
<https://www.ohata-isan.co.jp/>